

各位

2020年8月5日

一部改訂

8月4日の大阪府知事・大阪市長及び大阪はびきの医療センターによる共同記者会見を受け、弊社が販売しておりますポビドンヨード含有の「イソジンうがい薬」などの店頭在庫が品薄状態となっております。

お客様ならびに薬局・薬店の皆様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。必要とされる皆様に当該製品が広く行き渡りますように、弊社の供給体制を強化し、安定供給に向けて尽力して参ります。

お客様には、以下の各製品の使用回数を目安をご参考にしていただき、適切な数量をお買い求めいただきますようお願い申し上げます。

<各製品の使用回数を目安>

製品名	容量	使用可能回数を目安
イソジンうがい薬	50mL	約12回（*1回4ml使用した時）
	120mL	約30回（*1回4ml使用した時）
	250mL	約62回（*1回4ml使用した時）
イソジンうがい薬C	480mL	約24回（*1回20ml使用した時）

\*透明タイプの「イソジンクリアうがい薬」はポビドンヨードが含まれていません。

なお、ポビドンヨード含有の「イソジンうがい薬」は、第3類医薬品に指定されています。医薬品は、医薬品販売業などの許可がなければ販売することはできません。許可なく転売しますと薬機法違反に問われ、違反した者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます（薬機法第24条）。不適切な転売行為を行わないようお願いいたします。

**【ポビドンヨード含有のイソジンうがい薬の適正な使用方法について】**

以下の内容に注意していただき、適正にご使用ください。

- 本剤は、うがい用のみに使用し、キズややけどへの使用や、飲用（内服）はしないでください。
- 定められた用法・用量をお守りください。
  - ・ 「イソジンうがい薬」

1回、本剤 2~4mL を水約 60mL にうすめて、1日数回うがいしてください。

- ・ 「イソジンうがい薬 C」  
うすめずにそのまま適量（約 15~20mL）を口に含んで、2~3 回うがいをする。  
これを1日数回行ってください。

● 使用の際は以下のことにご注意ください。

- ・ 次の人は使用しないでください。  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- ・ 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
  - (1) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
  - (2) 口内のひどいただれ
  - (3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人

【正しいうがいの仕方】

- ①ひと口目は、  
強めに  
くちゆくちゅうがいをし、  
はき出す



- ②ふた口目は、  
上を向いて  
ガラガラうがいをし、  
はき出す（約15秒）



- ③さん口目も、  
上を向いて  
ガラガラうがいをし、  
はき出す（約15秒）

