## イソジン。うがい薬(第3類医薬品

|清涼化剤/-メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加 物)配合。お口とのどに スッキリ清涼成治めのインバンうがい薬です。

## ▲ 使用上の注意

してはいけないこと ※ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が おごりやすくなります)次の人は使用しないでください。本剤または本剤の 成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

「相談すること」 

1. 次の人は医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者 にご相談ください(1)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (2)口内のひどいただれのある人(3)甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後, 右の症状があら われた場合は副作用の可能 性があるので 直ちに使用を 中止し、この容器を持って医 師、歯科医師、薬剤師または 登録販売者にご相談ください

関係部位 皮瓜 発疹・発赤、かゆみ あれ、しみる、灼熱感、刺激感 消化器 その他

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師 の診療を受けてください。

ショック (アナフィラキシー)

症 状 使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん。 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸 音識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この 容器を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

お問い合わせ 窓口

大阪 06-6209-6948 東京 03-3406-8450 受付時間9時~17時(十日祝日を除く)

副作用被害救済制度 雷話 0120-149-931

®: イソジン はアイ ノヴァ ファーマの登 録商標です。



シオノギヘルスケア株式会社

製造販売元] iNova Pharmaceuticals

Japan 株式会社 東京都中央区八丁堀4-3-5 効能・効果 口腔内およびのどの 殺菌・消毒・洗浄、□臭の除去

用法・用量 うすめずにそのまま 適量(約15~20ml)を口に含ん で、2~3回うがいをする。これを 1日数回行ってください。

[田法・田量に関連する注音] ●定 められた田法・田量を厳守してくだ さい。小児に使用させる場合に は、保護者の指導監督のもとに使 用させてください。●本剤はうがい 用のみに使用し、キズややけどへ 使用や、内服はしないでください。

●目に入らないようにご注意くださ い。万一、目に入った場合には、すぐ に水またはぬるま湯で洗ってくだ さい。なお、症状が重い場合には、 眼科医の診療を受けてください。 成分・分量 1ml 中 ポビドン

ヨード3.5mg(有効ヨウ素として 0.35mg) 添加物として エタノール. グリセリン、 (-メントール、 サッカリ ンナトリウム、pH調整剤、香料、 その他1成分を含有しています。 [成分・分量に関連する注意]本剤 の使用により.銀を含有する歯科 材料(義歯など)が変色することが あります.

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当らない涼しい所に

密栓して保管してください。(2)小 児の手の届かない所に保管してく ださい。(3)他の容器に入れ替えな いでください。(誤用の原因になった り品質が変化します。)(A) 衣服など に付着すると着色しますのでご注 意ください。なお、付着した場合に はすぐに水でよく洗い落としてくだ さい。(5)使用期限をすぎた製品 は、使用しないでください。

> 製造番号.使用期限は 底面に記載しています。

この製品はキャップを 透明フィルムで

ラッピングしています。 MADE IN JAPAN

A9844