

頭痛・発熱に

第2類医薬品

非ピリン系解熱鎮痛薬

セデス®ファースト

シオノギヘルスケア

セデス・ファーストは、胃を守る成分を含んだ速く効く解熱鎮痛薬です。服用のしやすいフィルムコーティングされた錠剤で、痛みや発熱にすぐれた効果をあらわします。眠くなる成分を含んでいません。



使用上の注意 ……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用前後は飲酒しないでください

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児（15才未満）
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (6) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	め ま い
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。

(裏面につづく)

3. 5 ～ 6 回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

…… 効能・効果 ……

○頭痛・歯痛・月経痛（生理痛）・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・
関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
○悪寒・発熱時の解熱

…… 用法・用量 ……

次の量になるべく空腹時をさけて、水またはぬるま湯でのおのみください。
また、おのみになる間隔は 4 時間以上おいてください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	2 錠	3 回を限度とする
小児（7 才以上 15 才未満）	1 錠	
乳幼児（7 才未満）	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して
裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま
飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる
ことがあります）



…… 成分・分量 ……

セデス・ファーストは、白色のフィルムコーティング錠で、1 錠中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量	は た ら き
エテンザミド	200mg	熱を下げ、痛みをやわらげる
アセトアミノフェン	80mg	
無水カフェイン	40mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる
酸化マグネシウム	50mg	胃への負担をやわらげる

添加物として 乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、クロ
スカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチルを含有して
います。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) PTP シートから出して他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®:登録商標

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号