

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

飲みすぎ・胃もたれ・便秘

健胃整腸薬

第2類医薬品

ゆう たん えん
熊 膽 圓 S

シオノギ製薬

! 使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - 医師の治療を受けている人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛をとまなう下痢、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……


食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

……用法・用量……

次の量を食間に水またはぬるま湯でおのみください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1個	3回
11才以上15才未満	2/3個	
11才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 熊膽圓Sの取り出し方
右図のように熊膽圓Sの入っているアルミ箔（バイナライト）を指先で裂き、取り出してください。



成人1回量（1個）

11才以上15才未満は2/3個に割って服用ください。

……成分・分量……

熊膽圓Sは、黒褐色の割線入り平角型製剤で、3個（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

（1包：1個入）

成分	含量（3個中）
オウレンエキス	11.2mg （原生薬換算量70mg）
オウバクエキス	49.4mg （原生薬換算量380mg）
センブリエキス	14mg （原生薬換算量70mg）
ゲンチアナエキス	62mg （原生薬換算量200mg）
ダイオウエキス	40mg （原生薬換算量200mg）
ウコンエキス	28mg （原生薬換算量350mg）
アロエ	150mg
動物胆（牛胆）	50mg
アカメガシワエキス	275mg （原生薬換算量2500mg）

添加物として デキストリン、タルクを含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪府中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

株式会社 廣 貴 堂

富山市梅沢町2丁目9番1号