



缓解斑点、雀斑、因晒伤等导致的色素沉着

维生素C主成分药剂（含L-半胱氨酸）

销售名称：Cinal L White EXIA

第三类医药品



Cinal L White EXIA

由斑点、雀斑、因晒伤等导致的色素沉着，是由于年龄增长或紫外线等影响导致黑色素过度增加所致。Cinal L White Exia 含有抑制黑色素生成的维生素C 1200mg（成人1天的量），以及参与皮肤细胞新陈代谢的L-半胱氨酸，支持皮肤正常功能的泛酸钙、维生素B₆、生物素，可缓解斑点、雀斑、因晒伤等导致的色素沉着。

使用注意事项

咨询事项

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
腹泻
- 若服用1个月左右后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症状
皮肤	起疹
消化系统	恶心、呕吐、腹痛

效能及效果

- 缓解以下各症状：
斑点、雀斑、因晒伤或斑疹导致色素沉着
- 在以下情况下防止出血：
牙龈出血、流鼻血
“但使用1个月左右后这些症状仍未改善时，请咨询医师、药剂师或牙科医师。”
- 以下情况时维生素C的补充：
身体疲劳时、怀孕及哺乳期、病后体力下降时、老年期

用法及用量

请服用以下的量：

年龄	1 次的量	1 天服用次数
成人（15 岁以上）	3 片	2 次
儿童（7 岁以上未满 15 岁）	1 片	
婴幼儿（未满 7 岁）	禁止服用	

- 请严格遵守规定的用法及用量。
- 儿童服用时请在监护人指导监督下服用。

保管及使用注意事项

- (1) 请密封保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
(如果瓶盖未充分关闭，可能会因潮气等影响导致药品变质，因此每次服用后请务必将瓶盖关紧)
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- (4) 瓶内的填充物是为了防止运输过程中片剂破损，请在首次使用时务必将其丢弃。
- (5) 瓶内含有除臭剂。请勿服用。
- (6) 如果片剂沾到水分，可能会导致表面部分包衣溶解，请注意不要误滴水滴或用湿手触碰。
- (7) 为确保质量，开封后请在6个月内使用完毕。
- (8) 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。
Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”
电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450
受理时间：9点~17点（双休日、节假日除外）

关于“副作用被害救济制度”
(独)药品和医疗器械管理局
https://www.pmda.go.jp/kenkouhiga_camp/index.html
电话 0120-149-931（免费电话）

销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨2丁目6番18号

制造销售商

大峰堂药品工业株式会社
奈良县大和高田市根成柿574