



产品信息
Product features
QR Translator.

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

缓解斑点、雀斑、因晒伤等导致的色素沉着

维生素 C 主成分药剂 (含 L-半胱氨酸)

销售名称: Cinal L White EXIA Premium 2000



Cinal L White EXIA Premium 2000

第三类医药品

由斑点、雀斑、因晒伤等导致的色素沉着，是由于年龄增长或紫外线等影响导致黑色素过度增加所致。Cinal L White EXIA Premium 2000 含有抑制黑色素生成的维生素 C 2000mg (成人 1 天的量)，以及参与皮肤细胞新陈代谢的 L-半胱氨酸，支持皮肤正常功能的泛酸钙、维生素 B₆、生物素这 5 种有效成分，均为符合标准剂量范围的最大量*进行配比。缓解斑点、雀斑、因晒伤等导致的色素沉着。

※ 维生素 C 主成分药剂的制造销售符合标准剂量中的最大量

使用注意事项

咨询事项



相关部位	症状
皮肤	起疹
消化系统	恶心、呕吐、腹痛

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
腹泻
- 若服用 1 个月左右后症状仍未改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

效能及效果

- 缓解以下各症状：
斑点、雀斑、因晒伤或斑疹导致色素沉着
- 在以下情况下防止出血：
牙龈出血、流鼻血
“但使用 1 个月左右后这些症状仍未改善时，请咨询医师、药剂师或牙科医师。”
- 以下情况时维生素 C 的补充：
身体疲劳时、怀孕及哺乳期、病后病后体力下降时、老年期

用法及用量

请服用以下的量：

年龄	1 次的量	1 天服用次数
成人 (15 岁以上)	3 片	2 次
儿童 (7 岁以上未滿 15 岁)	1 片	
婴幼儿 (未滿 7 岁)	禁止服用	

- 请严格遵守规定的用法及用量。
- 儿童服用时请在监护人指导监督下服用。

成分及分量

Cinal L White EXIA Premium 2000 为白色薄膜包衣片剂，6 片 (成人 1 天的量) 中含有以下成分：


成分	含量 (6 片中)
抗坏血酸 (维生素 C)	2000 mg
L-半胱氨酸	240 mg
盐酸吡哆醇 (维生素 B ₆)	50 mg
泛酸钙	30 mg
生物素	500 μg

辅料包括：玉米淀粉、乳酸钙水合物、轻质无水硅酸、交联羧甲基纤维素钠、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、结晶纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙烯醇-丙烯酸-甲基丙烯酸酯共聚物、二氧化钛、滑石、聚乙二醇 6000、焦糖、甘油、巴西棕榈蜡。

此外，服用本药可能会影响尿液和大便的检查值，因此在接受相关检查时，请告知医师您正在服用本药。

保管及使用注意事项

- 请密封保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
(如果瓶盖未充分关闭，可能会因潮气等影响导致药品变质，因此每次服用后请务必将瓶盖关紧)
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 瓶内的填充物是为了防止运输过程中片剂破损，请在首次使用时务必将其丢弃。
- 瓶内含有除臭剂。请勿服用。
- 如果片剂沾到水分，可能会导致表面部分包衣溶解，请注意不要误滴水滴或用湿手触碰。
- 为确保质量，开封后请在 6 个月内使用完毕。
- 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。
Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”
电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450
受理时间：9 点~17 点 (双休日、节假日除外)

关于“副作用被害救济制度”
(独)药品和医疗器械管理局
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
电话 0120-149-931 (免费电话)

销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号

制造销售商

大峰堂药品工业株式会社

奈良县大和高田市根成柿 574