

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。
在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

21（部：2023 年 1 月修订）

支持多语言显示与语音播报。
It supports display and voice reading in multiple languages.

产品信息
Product features
QR Translator



对无法忍受的刺痛非常有效

比林类解热镇痛药

销售名称：SEDES HIGH
第二类医药品

SEDES HIGH



SEDES HIGH 通过配合包括镇痛作用强的异丙安替比林在内的 4 种成分，对剧烈疼痛也能发挥出色的镇痛效果。这是一种小型、易于服用的片剂，起效迅速且效果持久。



请仔细阅读

⚠ 使用注意事项



禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群请勿服用：
 - 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
 - 因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群
- 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品：
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药
- 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类（可能会出现嗜睡等症状）
- 服用前后请勿饮酒
- 请勿长期连续服用



咨询事项

- 以下人群在服用前请咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者：
 - 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
 - 孕妇或有其可能性的人群
 - 老年人
 - 因药物等出现过过敏症状的人群
 - 接受以下诊断的人群：心脏病、肾脏病、肝脏病、胃及十二指肠溃疡
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

相关部位	症状	相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒	精神神经系统	头晕
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振	其他	体温过低

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医：

症状名称	症状
休克 （过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
皮肤黏膜眼综合征 （史提芬强生症候群）、 中毒性表皮坏死松解症、 急性泛发性发疹性脓疱病	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
药物过敏综合征	会出现大范围皮肤发红、全身性起疹、发烧、全身无力、淋巴结（颈部、腋下、腹股沟等）红肿等症状。
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤	出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧等症状，并且突然出现或长时间持续。
哮喘	呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

（接背面）

3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：嗜睡
4. 若服用 5~6 次后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者



效能及效果

- 头痛、月经痛（生理痛）、牙痛、神经痛、腰痛、外伤疼痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛的镇痛
○恶寒及发烧时的解热



用法及用量

请尽量避免空腹，使用冷水或温水服用以下的量。

另外，两次服用之间请间隔 4 小时以上：

年龄	1 次的量	1 天服用次数
成人（15 岁以上）	2 片	不超过 3 次
未满 15 岁	禁止服用	

●请严格遵守规定的用法及用量。

●片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 包装凸起部分，压破背面的铝箔，取出后服用。
（如果误将整片包装吞下，可能会刺伤食道粘膜，导致意外事故）

片剂的取出方法

用手指按压取出



取出后服用



成分及分量

SEDES HIGH 为白色双层片剂，每片中含有以下成分：


成分	含量	作用
异丙安替比林（IPA）	75 mg	降低体温，缓解疼痛
对乙酰氨基酚	125 mg	
烯丙基异丙基乙酸脲	30 mg	辅助镇痛作用
无水咖啡因	25 mg	辅助镇痛作用，并缓解头痛

辅料包括：羧甲基纤维素钙、交联羧甲基纤维素钠、聚维酮、硬脂酸镁、结晶纤维素、玉米淀粉、乳糖一水合物、羟丙基纤维素。



保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
(2) 请保管在儿童无法触及的地方。
(3) 请勿从 PTP 包装中取出后换装到其他容器中。（会导致误用或变质）
(4) 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。

●Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”

电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450

受理时间：9 点~17 点（双休日、节假日除外）

关于“副作用被害救济制度”

●(独)药品和医疗器械管理局

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

电话 0120-149-931（免费电话）

制造销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号

支持多语言显示与语音播报。

