

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

9（部：2023年1月修订）

支持多语言显示与语音播报。

产品信息  
Product features  
QR Translator



有效缓解欲立即止住的剧烈疼痛

比林类解热镇痛药

销售名称：SEDES HIGH G

第二类医药品

# SEDES HIGH G



SEDES HIGH G 通过配合包括镇痛作用强的异丙安替比林在内的4种成分，对剧烈疼痛也能发挥出色的镇痛效果。



请仔细阅读



## 使用注意事项



### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群请勿服用：
  - 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
  - 因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群
- 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品  
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药
- 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类（可能会出现嗜睡等症状）
- 服用前后请勿饮酒
- 请勿长期连续使用



### 咨询事项

- 以下人群在服用前请咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者：
  - 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
  - 孕妇或有其可能性的人群
  - 老年人
  - 因药物等出现过过敏症状的人群
  - 接受以下诊断的人群 心脏病、肾脏病、肝脏病、胃及十二指肠溃疡
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

| 相关部位 | 症状         | 相关部位   | 症状   |
|------|------------|--------|------|
| 皮肤   | 起疹、发红、发痒   | 精神神经系统 | 头晕   |
| 消化系统 | 恶心、呕吐、食欲不振 | 其他     | 体温过低 |

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医：

| 症状名称                                                  | 症状                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 休克<br>（过敏性）                                           | 服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。                    |
| 皮肤黏膜眼综合征<br>（史提芬强生症候群）、<br>中毒性表皮坏死松懈症、<br>急性泛发性发疹性脓疱病 | 高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。 |
| 药物过敏综合征                                               | 会出现大范围皮肤发红、全身性起疹、发烧、全身无力、淋巴结（颈部、腋下、腹股沟等）红肿等症状。                  |
| 肝功能障碍                                                 | 出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。                        |
| 肾损伤                                                   | 出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。                        |
| 间质性肺炎                                                 | 上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧等症状，并且突然出现或长时间持续。                          |
| 哮喘                                                    | 呼吸时出现哮喘音、气闷等情况。                                                 |

- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：  
嗜睡
- 若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

（接背面）



## 功能及效果

- 头痛、月经痛（生理痛）、牙痛、神经痛、腰痛、外伤疼痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛的镇痛
- 恶寒及发烧时的解热



## 用法及用量

请尽量避开空腹，使用冷水或温水服用以下的量。

另外，服用间隔应在 4 小时以上：

| 年龄         | 1 次的量 | 1 天服用次数 |
|------------|-------|---------|
| 成人（15 岁以上） | 1 包   | 不超过 3 次 |
| 未满 15 岁    | 禁止服用  |         |

● 请严格遵守规定的用法及用量。



## 成分及分量

SEDES HIGH G 为白色颗粒剂，每包（1g）中含有以下成分。


| 成分          | 含量     | 作用           |
|-------------|--------|--------------|
| 异丙安替比林（IPA） | 150 mg | 降低体温，缓解疼痛    |
| 对乙酰氨基酚      | 250 mg |              |
| 烯丙基异丙基乙酸脬   | 60 mg  | 辅助镇痛作用       |
| 无水咖啡因       | 50 mg  | 辅助镇痛作用，并缓解头痛 |

辅料包括：乳糖一水合物、羟丙基纤维素、甲基纤维素、水合二氧化硅。



## 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- (4) 请勿服用超过使用期限的产品。



## 咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。

● Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”

电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450

受理时间：9 点～17 点（双休日、节假日除外）

关于“副作用被害救济制度”

●（独）药品和医疗器械管理局

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

电话 0120-149-931（免费电话）

制造销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号

支持多语言显示与语音播报。

产品信息  
Product features  
QR Translator.

