

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。
在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

20（部：2023 年 1 月修订）

支持多语言显示与语音播报。
It supports display and voice reading in multiple languages.

产品信息
Product features
QR Translator



迅速缓解头痛、发烧、生理痛

非比林类解热镇痛药

销售名称：新 SEDES 片
第二类医药品

新 SEDES 片



新 SEDES 片通过添加 4 种成分，发挥出优异的镇痛效果。是一款起效快、对胃温和的非比林类解热镇痛药。



请仔细阅读

使用注意事项



禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

1. 下述人群请勿服用：

- (1) 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
- (2) 因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群

2. 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品：

其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药

3. 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类（可能会出现嗜睡等症状）

4. 服用前后请勿饮酒

5. 请勿长期连续服用



咨询事项

1. 以下人群在服用前请咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者：

- (1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人群
- (2) 孕妇或有其可能性的人群
- (3) 患有水痘、流感或有其可能性的儿童（未满 15 岁）
- (4) 老年人
- (5) 因药物等出现过过敏症状的人群
- (6) 接受以下诊断的人群：心脏病、肾脏病、肝脏病、胃及十二指肠溃疡

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

相关部位	症状	相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒	精神神经系统	头晕
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振	其他	体温过低

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医：

症状名称	症状
休克 （过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
皮肤黏膜眼综合征 （史提芬强生症候群）、 中毒性表皮坏死松解症、 急性泛发性发疹性脓疱病	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
药物过敏综合征	会出现大范围皮肤发红、全身性起疹、发烧、全身无力、淋巴结（颈部、腋下、腹股沟等） <u>红肿等症状。</u>
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤	出现发烧、起疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧等症状，并且突然出现或长时间持续。
哮喘	呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：嗜睡

4. 若服用 5~6 次后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

（接背面）



功能及效果

- 头痛、月经痛（生理痛）、牙痛、神经痛、腰痛、外伤疼痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛的镇痛
- 恶寒及发烧时的解热



用法及用量

请尽量避开空腹，使用冷水或温水服用以下的量。

另外，服用间隔应在 4 小时以上：

年龄	1 次的量	1 天服用次数
成人（15 岁以上）	2 片	不超过 3 次
儿童（7 岁以上未满 15 岁）	1 片	
婴幼儿（未满 7 岁）	禁止服用	

- 请严格遵守规定的用法及用量。
- 儿童服用时应在监护人指导监督下服用。
- 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 包装凸起部分，压破背面的铝箔，取出后服用。
（如果误将整片包装吞下，可能会刺伤食道粘膜，导致意外事故）

片剂的取出方法

用手指按压取出



取出后服用



成分及分量

新 SEDES 片为白色片剂，每片中含有以下成分：


成分	含量	作用
邻乙氧苯甲酰胺	200 mg	降低体温，缓解疼痛
对乙酰氨基酚	80 mg	
烯丙基异丙基乙酸脲	30 mg	辅助镇痛作用
无水咖啡因	40 mg	辅助镇痛作用，并缓解头痛

辅料包括：乳糖一水合物、羧甲基纤维素钙、交联羧甲基纤维素钠、羟丙基纤维素、硬脂酸镁。



保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿从 PTP 包装中取出后换装到其他容器中。（会导致误用或变质）
- (4) 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。

●Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”

电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450

受理时间：9 点～17 点（双休日、节假日除外）

关于“副作用被害救济制度”

●(独) 药品和医疗器械管理局

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

电话 0120-149-931（免费电话）

制造销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号

支持多语言显示与语音播报。

产品信息

Product features
QR Translator.

