



产品信息
Product features



支持语音播报。请扫码查看。

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

3

镇咳药（非麻醉性）

销售名称：MEDICON 止咳片 Pro

MEDICON 止咳片 Pro

第二类医药品

SHIONOGI

MEDICON 止咳片 Pro 是一种非麻醉性止咳药，能直接作用于咳嗽中枢，可有效缓解令人难受的咳嗽症状。

请仔细阅读

使用注意事项



禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

1. 下述人群请勿使用：

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

2. 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品：

其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药、含抗组胺剂的口服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）

3. 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类（可能会出现嗜睡等状况）



咨询事项

1. 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

- 正在接受医师治疗的人群
- 孕妇或有其可能性的人群
- 因药物等出现过过敏症状的人群
- 拥有以下症状的人群：高烧

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕
呼吸系统	呼吸困难、气短

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医：

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等状况。

3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

嗜睡

4. 若服用 5~6 次后症状仍未改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者



效能及效果

咳嗽



用法及用量

请使用冷水或温水服用以下的量。

另外，两次服用之间请间隔 4 小时以上：

年龄	1 次的量	1 天服用次数
成人（15 岁以上）	2 片	3 次
未满 15 岁	禁止服用	

● 请严格遵守规定的用法及用量。

● 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 包装凸起部分，压破背面的铝箔，取出后服用。（如果误将整片包装吞下，可能会刺伤食道粘膜，导致意外事故）

片剂的取出方法

用手指按压取出



取出后服用



成分及分量

MEDICON 止咳片 Pro 是白色片剂，6 片（成人 1 天的量）中含有以下成分：

成分	含量（6 片中）	作用
氢溴酸右美沙芬水合物	90 mg	止咳

辅料包括：含有乳糖一水合物、玉米淀粉、结晶纤维素、硬脂酸镁、滑石、白虫胶、蓖麻油。



保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿从 PTP 包装中取出后换装到其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。

● Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”

电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450

受理时间：9 点~17 点（双休日、节假日除外）

关于“副作用被害救济制度”

●（独）药品和医疗器械管理局

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

电话：0120-149-931（免费电话）

制造销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号