



支持多语言语音播报。请扫码查看。

产品信息
Product features
QR Translator



1

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

镇咳祛痰药（非麻醉性）

销售名称：MEDICON 止咳液 Pro

MEDICON 止咳液 Pro

第二类医药品

SHIONOGI

MEDICON 止咳液 Pro 是一种非麻醉性止咳药，含有可直接作用于咳嗽中枢、缓解咳嗽的氢溴酸右美沙芬水合物，以及有助于排痰的甲酚磺酸钾两种有效成分。通过这两种成分的作用，可有效缓解令人难受的咳嗽、咳痰的症状。

请仔细阅读

使用注意事项



禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

1. 下述人群请勿服用：

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

2. 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品：

其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药、含抗组胺剂的口服药等（鼻炎用口服药、晕车药、抗过敏药等）

3. 服用后请勿驾驶交通工具或操作机械类

（会出现嗜睡症状）

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕
呼吸系统	呼吸困难、气短

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医：

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症。

- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：嗜睡
- 若服用 5~6 次后症状仍未改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
- 另外，即使症状有所改善，若服用超过 2 周，请咨询医师、药剂师或登录贩卖者



咨询事项

1. 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

- 正在接受医师治疗的人群
- 孕妇或有其可能性的人群
- 因药物等出现过过敏症状的人群
- 拥有以下症状的人群：高烧

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：



效能及效果

咳嗽、咳痰



用法及用量

请 1 天 3 次服用下述 1 次的量。另外，服用间隔应在 4 小时以上：

- 请严格遵守规定的用法及用量。

年龄	1 次的量
成人（15 岁以上）	6 mL
未满 15 岁	禁止服用

采用了儿童难以轻易打开的安全瓶盖。

安全瓶盖的使用方法
向下按压瓶盖的同时，

② 逆时针旋转打开

正确的服用方法
将量杯的边缘贴近瓶口，注入 1 次的量（6mL）。请务必遵守 1 次的量进行服用。

※ 请将瓶子放在平坦的地方。



成分及分量

MEDICON 止咳液 Pro 为淡黄褐色透明粘稠液体，18mL（成人 1 天的量）中含有以下成分：

成分	含量（18 mL 中）	作用
氢溴酸右美沙芬水合物	45 mg	止咳
甲酚磺酸钾	270 mg	使痰液更易咳出

辅料包括：乙醇、白糖、焦糖、苯甲酸、氢氧化钠、苯甲酸苄酯、乙基香兰素、甘油、香兰素、香料。



保管及使用注意事项

- 请密封保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿倒入其他容器中（可能导致误用或变质）。
- 使用完量杯后，请用水清洗并保持清洁保管。
- 盖瓶盖时，请先将瓶口擦拭干净再盖紧。如果瓶口沾有药液就盖上瓶盖，可能会导致开盖困难。另外，如果盖得不紧，内部液体可能会漏出或受到污染。
- 如果瓶盖难以打开，可将瓶盖部分浸泡在热水（50~60℃）中会更容易打开。
- 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。

● Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”
电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450
受理时间：9 点~17 点（双休日、节假日除外）

关于“副作用被害救济制度”

●（独）药品和医疗器械管理局
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
电话：0120-149-931（免费电话）

制造销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号