



支持多语言语音播报。请扫码查看。

产品信息
Product features
QR Translator



1

本说明书是以日语编写的附件的翻译版本，旨在帮助在日本购买并使用本产品的消费者更好地理解商品。在服用本产品前请务必仔细阅读本说明书，并充分理解其内容。

祛痰药

日本药典 L-羧甲司坦片

销售名称：羧甲司坦祛痰片 Pro500

羧甲司坦祛痰片 Pro500

第二类医药品

SHIONOGI

羧甲司坦祛痰片 Pro500 是一款通过 L-羧甲司坦的作用，使痰液更易咳出的祛痰药。



请仔细阅读

使用注意事项



禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)

- 下述人群请勿服用：
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
- 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品：
其他镇咳祛痰药、感冒药



咨询事项

- 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者：
(1) 正在接受医师治疗的人群
(2) 孕妇或有其可能性的人群
(3) 哺乳期人群
(4) 老年人
(5) 因药物等出现过过敏症状的人群
(6) 拥有以下症状的人群：高烧
(7) 接受以下诊断的人群：心脏病、肝脏病
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者：

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振、腹泻、腹痛、腹部胀满感、口腔干燥
呼吸系统	呼吸困难
其他	发热、浮肿

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医：

症状名称	症状
休克 (过敏性)	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症。
皮肤黏膜眼综合症 (史提芬强生症候群)、 中毒性表皮坏死脱落症	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症持续或急剧恶化。
肝功能障碍	出现发烧、发痒、起疹、黄疸(皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症。

- 若服用 5~6 次后症状仍无改善时请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
另外，即使症状有所改善，若服用超过 2 周，请咨询医师、药剂师或登录贩卖者



效能及效果

咳嗽



用法及用量

请使用冷水或温水服用以下的量。另外，两次服用之间请间隔 4 小时以上：

年龄	1 次的量	1 天服用次数
成人 (15 岁以上)	1 片	3 次
未满 15 岁	禁止服用	

● 请严格遵守规定的用法及用量。

● 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 包装凸起部分，压破背面的铝箔，取出后服用。
(如果误将整片包装吞下，可能会刺伤食道粘膜，导致意外事故)



成分及分量

羧甲司坦祛痰片 Pro500 为白色薄膜包衣片剂，3 片 (成人 1 天的量) 中含有以下成分：

成分	含量 (3 片中)	功能
L-羧甲司坦	1500 mg	使痰液更易咳出

辅料包括：交联羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇 (部分皂化物)、蔗糖脂肪酸酯、硬脂酸镁、甲基纤维素、羟丙基纤维素、滑石。



保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿从 PTP 包装中取出后换装到其他容器中。
(会导致误用或变质)
- 请勿服用超过使用期限的产品。



咨询方式

如对本品有任何疑问，请向购买处或下述单位咨询。

● Shionogi Healthcare Co., Ltd. “医药信息中心”

电话：大阪 06-6209-6948、东京 03-3406-8450

受理时间：9 点~17 点 (双休日、节假日除外)

关于“副作用被害救济制度”

● (独) 药品和医疗器械管理局

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

电话：0120-149-931 (免费电话)

制造销售商

Shionogi Healthcare Co., Ltd.

大阪市中央区北滨 2 丁目 6 番 18 号