

此文件為日文仿單之譯文，提供給在日本購買本產品使用的消費者，協助理解商品。服用本產品前，請務必詳閱此文件，理解內容。

斑點、雀斑、疲勞時

維生素 C 主藥製劑

第 3 類醫藥品

▼Product features

# Cinal EX pro 顆粒



人體無法自行合成維生素 C，因此每天攝取很重要。

Cinal EX pro 顆粒是一款適合補充維生素 C 的維生素製劑，為能在口中迅速溶解、容易服用的顆粒。此外，除了維生素 C 之外，添加具有抗氧化作用的天然型維生素 E、幫助維持皮膚正常功能的泛酸鈣，以及幫助維持肌膚健康的維生素 B<sub>2</sub>。



## 使用上的注意事項.....



### 諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
 

相關部位	症狀
消化器官	噁心、嘔吐、胃部不適感、胃部膨脹感、食慾不振
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉
- 即使服用 1 個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 療效及效果.....

- 補充下列情況下的維生素 C  
身體疲勞時、懷孕・哺乳期、病中病後的體力低下時、老年期
- 緩解下列各項症狀  
斑點、雀斑、因曬傷或斑疹造成的色素沉澱
- 預防下列情況下的出血  
牙齦出血、流鼻血  
「但關於上述 2 及 3 的症狀，即使使用 1 個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或牙科醫師。」

## 用法及用量.....

請服用下列劑量。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人(15 歲以上)	1~2 包	2 次
7 歲以上，未滿 15 歲	1 包	
1 歲以上，未滿 7 歲	1/2 包	
未滿 1 歲	不得服用	

●請嚴格遵守規定的用法及用量。

●使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

## .....成分及分量.....

Cinal EX pro 顆粒為黃色顆粒製劑，4包(1.3g × 4、成人1天最大劑量)中，含有下列成分。


成分	含量(4包中)
抗壞血酸(維生素C)	2000 mg
核黃素四丁酸酯(維生素B <sub>2</sub> 衍生物)	12 mg
d-α-生育酚乙酸酯(天然型維生素E)	30 mg
泛酸鈣	30 mg

添加物：含水二氧化矽、乳酸鈣水合物、粉末還原麥芽糖水餡、羥丙基纖維素、三氯蔗糖、D-甘露醇、蔗糖脂肪酸酯、香料、生育酚

- 服用本藥劑後，尿液可能變黃，這是因為本藥劑所含的維生素B<sub>2</sub>被吸收利用，其部分透過尿液排出，無需擔心。
- 服用本藥劑後，可能會對尿液及糞便的檢驗值造成影響，因此接受這些檢查的情況下，請告知醫師您正在服用本藥劑。

## .....保管及使用上的注意事項.....

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。  
(可能導致誤用或變質)
- (4) 使用分割1包後剩餘量的情況下，請將袋口反折保管，於2天內使用完畢。
- (5) 請勿服用超過使用期限的產品。



## .....詢問處.....

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

**Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」**

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間：9點～17點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

(獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931 (免費專線)

-----  
製造銷售商

**Shionogi Healthcare 株式會社**

大阪市中央區北濱2丁目6番18號