



減緩斑點、雀斑、因曬傷等造成的色素沉澱

維生素 C 主藥製劑 (添加 L-半胱氨酸)

銷售名稱: Cinal L White EXIA

第 3 類醫藥品



## Cinal L White EXIA

斑點、雀斑、因曬傷等造成的色素沉澱，會受到年齡增長或紫外線等影響，因黑色素過度增生而引發。Cinal L White EXIA 添加抑制黑色素生成的 1200mg 維生素 C (成人 1 天劑量)、肌膚細胞新陳代謝相關的 L-半胱氨酸，以及幫助維持肌膚正常功能的泛酸鈣、維生素 B<sub>6</sub>、生物素，減緩斑點、雀斑、因曬傷等造成的色素沉澱。

### 使用上的注意事項

#### 諮詢事項

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉
- 即使服用 1 個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

| 相關部位 | 症狀       |
|------|----------|
| 皮膚   | 發疹       |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、腹痛 |

### 療效及效果

- 緩解下列各項症狀  
斑點、雀斑、因曬傷或斑疹造成的色素沉澱
- 預防下列情況下的出血  
牙齦出血、流鼻血  
「但關於這些的症狀，即使使用 1 個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或牙科醫師。」
- 補充下列情況下的維生素 C  
身體疲勞時、懷孕・哺乳期、病中病後的體力低下時、老年期

### 用法及用量

請服用下列劑量。

| 年齡                 | 1 次劑量 | 1 天服用次數 |
|--------------------|-------|---------|
| 成人 (15 歲以上)        | 3 錠   | 2 次     |
| 兒童 (7 歲以上，未滿 15 歲) | 1 錠   |         |
| 嬰幼兒 (未滿 7 歲)       | 不得服用  |         |

- ・請嚴格遵守規定的用法及用量。
- ・使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

### 保管及使用上的注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊，保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。  
(瓶蓋沒有蓋緊的情況下，藥品可能因受潮等影響而變質，因此每次服用後，請蓋緊瓶蓋)
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- (4) 瓶內的填充物是為了防止錠劑在運送過程中破損，因此開始使用前，請務必丟棄。
- (5) 瓶內有除臭劑。請勿服用。
- (6) 水分接觸到錠劑，表面的部分膜衣可能溶解，因此請避免不小心滴到水滴或用濕手觸摸。
- (7) 一旦開封後，基於保持品質的觀點，請於 6 個月內使用完畢。
- (8) 請勿服用超過使用期限的產品。



### 詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」  
電話: 大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
服務時間: 9 點~17 點 (週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

(獨立行政法人) 醫藥品醫療機器綜合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhiga\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhiga_camp/index.html)  
電話: 0120-149-931 (免費專線)

銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號

製造銷售商

大峰堂藥品工業株式會社

奈良縣大和高田市根成柿 574