



減緩斑點、雀斑、曬傷等造成的色素沉澱

維生素 C 主藥製劑 (添加 L-半胱胺酸)

銷售名稱: Cinal L White EXIA Premium 2000



Cinal L White EXIA Premium 2000

第 3 類醫藥品

斑點、雀斑、曬傷等造成的色素沉澱，會受到年齡增長或紫外線等影響，因黑色素過度增生而引發。Cinal L White EXIA Premium 2000 添加抑制黑色素生成的 2000 mg 維生素 C (成人 1 天劑量)，而關於肌膚細胞新陳代謝相關的 L-半胱胺酸，以及幫助維持肌膚正常功能的泛酸鈣、維生素 B₆、生物素這 5 種有效成分，則添加允許標準內最大量^{*}。減緩斑點、雀斑、曬傷等造成的色素沉澱。

※ 維生素 C 主藥製劑製造銷售允許標準的最大量

使用上的注意事項

諮詢事項



- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
牙齦出血、流鼻血
「但關於這些症狀，即使使用 1 個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或牙科醫師。」
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 即使服用 1 個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	噁心、嘔吐、腹痛

療效及效果

- 緩解下列各項症狀
斑點、雀斑、因曬傷或斑疹造成的色素沉澱
- 預防下列情況下的出血
牙齦出血、流鼻血
「但關於這些症狀，即使使用 1 個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或牙科醫師。」
- 補充下列情況下的維生素 C
身體疲勞時、懷孕・哺乳期、病中病後的體力低下時、老年期

用法及用量

請服用下列劑量。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人 (15 歲以上)	3 錠	2 次
兒童 (7 歲以上, 未滿 15 歲)	1 錠	
嬰幼兒 (未滿 7 歲)	不得服用	

- 請嚴格遵守規定的用法及用量。
- 使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。

成分及分量

Cinal L White EXIA Premium 2000 為白色膜衣錠，6 錠 (成人 1 天劑量) 中，含有下列成分。

成分	含量 (6 錠中)
抗壞血酸 (維生素 C)	2000 mg
L-半胱胺酸	240 mg
吡哆醇鹽酸鹽 (維生素 B ₆)	50 mg
泛酸鈣	30 mg
生物素	500 μg

添加物：玉米澱粉、乳酸鈣水合物、輕質無水矽酸、交聯羧甲基纖維素鈉、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂、結晶纖維素、羥丙甲纖維素、聚乙稀醇-丙烯酸-甲基丙烯酸甲酯共聚物、二氧化鈦、滑石、聚乙二醇 6000、焦糖、甘油、巴西棕櫚蠟

• 服用本藥劑後，可能會對尿液及糞便的檢驗值造成影響，因此接受這些檢查的情況下，請告知醫師您正在服用本藥劑。

保管及使用上的注意事項

- 請將瓶蓋蓋緊，保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
(瓶蓋沒有蓋緊的情況下，藥品可能因受潮等影響而變質，因此每次服用後，請蓋緊瓶蓋)
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- 瓶內的填充物是為了防止錠劑在運送過程中破損，因此開始使用前，請務必丟棄。
- 瓶內有除臭劑。請勿服用。
- 水分接觸到錠劑，表面的部分膜衣可能溶解，因此請避免不小心滴到水滴或用濕手觸摸。
- 一旦開封後，基於保持品質的觀點，請於 6 個月內使用完畢。
- 請勿服用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間：9 點~17 點 (週六、週日、國定假日除外)

銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號

製造銷售商

大峰堂藥品工業株式會社

奈良縣大和高田市根成柿 574

關於「副作用受害救濟制度」

(獨立行政法人) 醫藥品醫療機器綜合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931 (免費專線)