

此文件為日文仿單之譯文，提供給在日本購買本產品使用的消費者，協助理解商品。服用本產品前，請務必詳閱此文件，理解內容。

21(一部:2023年1月修訂)

支援多國語言顯示及語音朗讀。



產品資訊

Product features
QR Translator

對於無法忍受的劇烈疼痛有顯著效果

匹林類解熱鎮痛藥

銷售名稱: SEDES HIGH

第2類醫藥品

SEDES HIGH



SEDES HIGH 添加具有強效鎮痛作用的異丙基安替比林等4種成分，因此對於劇烈疼痛也能發揮優異的鎮痛效果。小型、容易服用的錠劑，快速生效且效果持續。



敬請詳閱

使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

1. 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- (2) 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人

2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品

其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等）

4. 服用前後，請勿飲酒

5. 請勿長期連續使用



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人
- (2) 孕婦或可能懷孕的人
- (3) 年長者
- (4) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (5) 被診斷出下列疾病的人 心臟病、腎臟病、肝臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀	相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢	精神神經系統	頭暈
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振	其他	過度的體溫低下

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、 中毒性表皮壞死鬆解症、 急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等持續，或者突然惡化。
藥物過敏症候群	出現皮膚廣範圍發紅、全身出疹、發燒、身體倦怠、淋巴結(脖子、腋下、腹股溝等)腫大等。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者這些症狀突然出現或持續。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

(接背面)

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 嗜睡
4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者



療效及效果

- 頭痛、經痛(生理痛)、牙痛、神經痛、腰痛、外傷痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛的鎮痛
- 惡寒、發燒時的解熱



用法及用量

請盡量避免在空腹時，搭配水或溫水服用下列劑量。

此外，請間隔 4 小時以上服用。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人(15 歲以上)	2 錠	最多 3 次
未滿 15 歲	不得服用	

- 請嚴格遵守規定的用法及用量。

- 取出錠劑的方法

如右圖所示，請以指尖用力按壓裝入錠劑的 PTP 片材的凸部，壓破背面的鋁箔，取出服用。
(不小心直接誤食，可能導致鋁箔刺破食道黏膜等意外事故)

取出錠劑的方法

以手指壓出



取出服用



成分及分量

SEDES HIGH 為白色雙層錠，1 錠中含有下列成分。


成分	含量	作用
異丙基安替比林(IPA)	75 mg	降低體溫，緩解疼痛
乙醯胺酚	125 mg	
丙戊醯脲	30 mg	幫助抑制疼痛的作用
無水咖啡因	25 mg	除了幫助抑制疼痛的作用之外，還能緩解頭痛。

添加物：羧甲基纖維素鈣、交聯羧甲基纖維素鈉、聚維酮、硬脂酸鎂、結晶纖維素、玉米澱粉、乳糖水合物、羧丙基纖維素



保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿從 PTP 片材取出，換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間：9 點~17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

(獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號

支援多國語言顯示及語音朗讀。

產品資訊
Product features
QR Translator

