

2(部):2023 年 1 月修訂)

支援多國語言顯示及語音朗讀。

產品資訊  
Product features  
QR Translator.



對於劇烈疼痛有顯著效+  
添加保護胃部的成分

匹林類解熱鎮痛藥

銷售名稱:SEDES HIGH PROTECT

第2類醫藥品

# SEDES HIGH PROTECT

SHIONOGI

4種鎮痛成分對於  
劇烈疼痛有顯著效果



添加中和胃酸的同時，  
保護胃黏膜的成分

SEDES HIGH PROTECT 添加具有強效鎮痛作用的異丙基安替比林等  
4種成分，因此對於劇烈疼痛也能發揮優異的鎮痛效果。此外，  
添加中和胃酸的同時，保護胃黏膜的成分。



敬請詳閱

## 使用上的注意事項



### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

#### 1. 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- (2) 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人

#### 2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品

其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥

#### 3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等）

#### 4. 服用前後，請勿飲酒

#### 5. 請勿長期連續服用



### 諮詢事項

#### 1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人
- (2) 孕婦或可能懷孕的人
- (3) 年長者
- (4) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (5) 被診斷出下列疾病的人 心臟病、腎臟病、肝臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

| 相關部位 | 症狀         | 相關部位   | 症狀      |
|------|------------|--------|---------|
| 皮膚   | 發疹、發紅、發癢   | 精神神經系統 | 頭暈      |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、食慾不振 | 其他     | 過度的體溫低下 |

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

| 症狀名稱                                    | 症狀                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 休克<br>(過敏性)                             | 服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。                            |
| 史蒂芬強森症候群、<br>中毒性表皮壞死鬆解症、<br>急性廣泛性發疹性膿疱症 | 發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等持續，或者突然惡化。 |
| 藥物過敏症候群                                 | 出現皮膚廣範圍發紅、全身出疹、發燒、身體倦怠、淋巴結(脖子、腋下、腹股溝等)腫大等。                            |
| 肝功能障礙                                   | 出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。                                |
| 腎功能障礙                                   | 出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。                                |
| 間質性肺炎                                   | 爬樓梯或稍微勉強身體，就會出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者這些症狀突然出現或持續。                          |
| 氣喘                                      | 呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。                                                 |

(接背面)

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 嗜睡
4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者



## 療效及效果

- 頭痛、經痛(生理痛)、牙痛、神經痛、腰痛、外傷痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛的鎮痛
- 惡寒、發燒時的解熱



## 用法及用量

請盡量避免在空腹時，搭配水或溫水服用下列劑量。

此外，服用間隔請間隔 4 小時以上。

| 年齡         | 1 次劑量 | 1 天服用次數 |
|------------|-------|---------|
| 成人(15 歲以上) | 2 錠   | 最多 3 次  |
| 未滿 15 歲    | 不得服用  |         |

- 請嚴格遵守規定的用法及用量。

- 取出錠劑的方法

如右圖所示，請以指尖用力按壓裝入錠劑的 PTP 片材的凸部，壓破背面的鋁箔，取出服用。  
(不小心直接誤食，可能導致鋁箔刺破食道黏膜等意外事故)

取出錠劑的方法

以手指壓出



取出服用



## 成分及分量

SEDES HIGH PROTECT 為白色雙層錠劑，1 錠中含有下列成分。

| 成分            | 含量     | 作用                   |
|---------------|--------|----------------------|
| 異丙基安替比林 (IPA) | 75 mg  | 降低體溫，緩解疼痛            |
| 乙醯胺酚          | 125 mg |                      |
| 丙戊醯脲          | 30 mg  | 幫助抑制疼痛的作用            |
| 無水咖啡因         | 25 mg  | 除了幫助抑制疼痛的作用之外，還能緩解頭痛 |
| 矽酸鋁鎂          | 50 mg  | 中和胃酸的同時，保護胃黏膜        |

添加物：羧甲基纖維素鈣、交聯羧甲基纖維素鈉、聚維酮、硬脂酸鈣、結晶纖維素、玉米澱粉、乳糖水合物、羥丙基纖維素



## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿從 PTP 片材取出，換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。



## 詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

● Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間：9 點~17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

● (獨立行政法人) 醫藥品醫療機器綜合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號

支援多國語言顯示及語音朗讀。

產品資訊  
Product features  
QR Translator.

