

此文件為日文仿單之譯文，提供給在日本購買本產品使用的消費者，協助理解商品。服用本產品前，請務必詳閱此文件，理解內容。

20(部):2023 年 1 月修訂)

支援多國語言顯示及語音朗讀。



對於頭痛、發燒、生理痛，快速生效

非匹林類解熱鎮痛藥

銷售名稱:新 SEDES 錠

第 2 類醫藥品

新 SEDES 錠



新 SEDES 錠添加 4 種成分，能發揮優異的鎮痛效果。快速生效，不傷胃的非吡啶類解熱鎮痛藥。

敬請詳閱

使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

1. 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- (2) 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人

2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品

其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等）

4. 服用前後，請勿飲酒

5. 請勿長期連續服用



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人
- (2) 孕婦或可能懷孕的人
- (3) 患有水痘、流感或有其可能性的兒童（未滿 15 歲）。
- (4) 年長者
- (5) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (6) 被診斷出下列疾病的人 心臟病、腎臟病、肝臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀	相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢	精神神經系統	頭暈
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振	其他	過度的體溫低下

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、 中毒性表皮壞死鬆解症、 急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒有食慾等持續，或者突然惡化。
藥物過敏症候群	出現皮膚廣範圍發紅、全身出疹、發燒、身體倦怠、淋巴結(脖子、腋下、腹股溝等)腫大等。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者這些症狀突然出現或持續。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 嗜睡

4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

(接背面)



療效及效果

- 頭痛、經痛(生理痛)、牙痛、神經痛、腰痛、外傷痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛的鎮痛
- 惡寒、發燒時的解熱



用法及用量

請盡量避免在空腹時，搭配水或溫水服用下列劑量。

此外，請間隔 4 小時以上服用。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人 (15 歲以上)	2 錠	最多 3 次
兒童 (7 歲以上, 未滿 15 歲)	1 錠	
嬰幼兒 (未滿 7 歲)	不得服用	

- 請嚴格遵守規定的用法及用量。
- 使兒童服用的情況下，請在家長的指導監督下使其服用。
- 取出錠劑的方法

如右圖所示，請以指尖用力按壓裝入錠劑的 PTP 片材的凸部，壓破背面的鋁箔，取出服用。
(不小心直接誤食，可能導致鋁箔刺破食道黏膜等意外事故)



成分及分量

新 SEDES 錠為白色錠，1 錠中含有下列成分。


成分	含量	作用
鄰乙氧苯甲醯胺	200 mg	降低體溫，緩解疼痛
乙醯胺酚	80 mg	
丙戊醯脲	30 mg	幫助抑制疼痛的作用
無水咖啡因	40 mg	除了幫助抑制疼痛的作用之外，還能緩解頭痛。

添加物：乳糖水合物、羧甲基纖維素鈣、交聯羧甲基纖維素鈉、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂



保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿從 PTP 片材取出，換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

●Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間：9 點～17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

●(獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號

支援多國語言顯示及語音朗讀。

