



支援多國語言，為您語音朗讀。敬請掃描。

產品資訊
Product features
QR Translator



3_部:2023 年 1 月修訂

此文件為日文仿單之譯文，提供給在日本購買本產品使用的消費者，協助理解商品。服用本產品前，請務必詳閱此文件，理解內容。

感冒藥(非匹林類)

銷售名稱:Pylon PL 顆粒 Pro

Pylon PL 顆粒 Pro

第2類醫藥品

SHIONOGI

Pylon PL 顆粒 Pro 是一款非吡啶類感冒藥，透過解熱鎮痛成分水楊醯胺和乙醯胺酚，抗組織胺成分甲烯二水楊酸苯，以及幫助抑制疼痛作用的無水咖啡因這 4 種有效成分的作用，對於「喉嚨痛」、「發燒」、「流鼻水」等各種感冒症狀，發揮優異的效果。

敬請詳閱



使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

1. 下列的人請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- (2) 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人
- (3) 被診斷出下列疾病的人：排尿困難、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼
- (4) 未滿 15 歲的兒童

2. 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類(可能出現嗜睡等)

4. 服用前後，請勿飲酒

5. 請勿長期連續服用



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人
- (2) 正在哺乳的人、孕婦或可能懷孕的人
- (3) 年長者
- (4) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (5) 有下列症狀的人：發高燒
- (6) 被診斷出下列疾病的人：心臟病、肝臟病、腎臟病、支氣管氣喘

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、浮腫
血液	皮膚或黏膜變成暗紫色、貧血
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胸口灼熱、腹痛、胃腸出血
精神神經系統	頭暈、倦怠感、頭痛、耳鳴、重聽、視覺障礙、焦慮感、神經過敏、失眠、痙攣、輕度意識模糊、亢奮、幻覺、妄想
呼吸器官	咳嗽、呼吸困難
循環器官	高血壓、低血壓、心跳過速
泌尿器官	排尿困難、尿滯留
其他	過度的體溫低下、發汗、顫抖、鼻炎症狀、結膜炎

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、尋麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿胞症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿胞)、全身倦怠、沒有食慾等持續，或者突然惡化。
藥物過敏症候群	出現皮膚廣範圍發紅、全身出疹、發燒、身體倦怠、淋巴結(脖子、腋下、腹股溝等)腫大等。
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚或黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。
無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。
血小板減少	因血液中的成分——血小板的數量減少，出現流鼻血、牙齦出血、瘀青等出血症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者這些症狀突然出現或持續。
肝功能障礙	出現發燒、發疹、發熱、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。
橫紋肌溶解症	出現手腳、肩膀、腰等的肌肉疼痛、手腳痠麻、無力、僵硬、全身倦怠、紅褐色尿等。
青光眼發作	突然出現眼睛充血、眼睛痛、視力模糊、頭痛、噁心等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

口乾、嗜睡

4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者



療效及效果

緩解感冒的各項症狀(喉嚨痛、發燒、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、惡寒(發燒伴隨的發冷)、頭痛、關節痛、肌肉疼痛)



用法及用量

成人(15 歲以上)1 次 1 包，1 天 4 次，原則上請於每餐後及就寢前，間隔 4 小時以上服用。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人(15 歲以上)	1 包	4 次
未滿 15 歲	不得服用	

●請嚴格遵守規定的用法及用量。



成分及分量

Pylon PL 顆粒 Pro 為白色顆粒，4 包(1g×4・成人 1 天劑量)中，含有下列成分。

成分	含量(4 包中)	作用
水楊醯胺	1080 mg	抑制疼痛，降低體溫
乙醯胺酚	600 mg	
無水咖啡因	240 mg	幫助抑制疼痛的作用
甲烯二水楊酸苯	54 mg	抑制流鼻水、鼻塞、打噴嚏

添加物：乳糖水合物、玉米澱粉、氯化鈉、白糖、含水二氧化碳



保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。



製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號