



鎮咳藥(非麻醉類)

銷售名稱:Medicon 止咳錠 Pro

Medicon 止咳錠 Pro

第2類醫藥品

SHIONOGI

Medicon 止咳錠 Pro 是一款非麻醉類止咳藥，直接作用於咳嗽中樞，對於惱人的咳嗽症狀發揮優異的效果。

敬請詳閱



使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

1. 下列的人請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人

2. 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥、含有抗組織胺劑的內服藥等
(鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類

(可能出現嗜睡等)



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療的人
- (2) 孕婦或可能懷孕的人
- (3) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (4) 有下列症狀的人 發高燒

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	頭暈
呼吸器官	呼吸困難、氣短

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、尋麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 嗜睡

4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者



療效及效果

咳嗽



用法及用量

請搭配水或溫水服用下列劑量。

此外，請間隔 4 小時以上服用。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人(15 歲以上)	2 錠	3 次
未滿 15 歲	不得服用	

● 請嚴格遵守規定的用法及用量。

● 取出錠劑的方法

如右圖所示，請以指尖用力按壓裝入錠劑的 PTP 片材的凸部，壓破背面的鋁箔，取出服用。(不小心直接誤食，可能導致鋁箔刺破食道黏膜等意外事故。)

取出錠劑的方法

以手指壓出



取出服用



成分及分量

Medicon 止咳錠 Pro 為白色錠劑，6 錠(成人 1 天劑量)中，含有下列成分。


成分	含量(6 錠中)	作用
氫溴酸右美沙芬水合物	90 mg	鎮靜咳嗽

添加物：乳糖水合物、玉米澱粉、結晶纖維素、硬脂酸鎂、滑石、白蠟膠、蓖麻油



保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿從 PTP 片材取出，換裝於其他容器。
(可能導致誤用或變質)
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

● Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」

電話:大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

服務時間:9 點~17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

● (獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號