



支援多國語言，為您語音朗讀。敬請掃描。

產品資訊
Product features
QR Translator



此文件為日文仿單之譯文，提供給在日本購買本產品使用的消費者，協助理解商品。服用本產品前，請務必詳閱此文件，理解內容。

鎮咳祛痰藥(非麻醉類)

銷售名稱:Medicon 止咳液 Pro

Medicon 止咳液 Pro

第 2 類醫藥品



Medicon 止咳液 Pro 是一款非麻醉類止咳藥，透過直接作用於咳嗽中樞，鎮靜咳嗽的氫溴酸右美沙芬水合物、幫助排痰的煤溜油酚磺酸鉀這 2 種有效成分的作用，對於惱人的咳嗽及痰的症狀，發揮優異的效果。



敬請詳閱

⚠ 使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

1. 下列的人請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人

2. 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類

(可能出現嗜睡等)

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	頭暈
呼吸器官	呼吸困難、氣短

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者嗜睡
- 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
- 此外，即使症狀改善，服用超過 2 週的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- 正在接受醫師治療的人
- 孕婦或可能懷孕的人
- 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- 有下列症狀的人 發高燒

2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者



療效及效果

咳嗽、痰



用法及用量

1 天 3 次，服用下列 1 次劑量。

此外，請間隔 4 小時以上服用。

●請嚴格遵守規定的用法及用量。

年齡	1 次劑量
成人(15 歲以上)	6 mL
未滿 15 歲	不得服用

採用兒童無法輕易打開的安全瓶蓋。

安全瓶蓋的使用方法

向下壓著瓶蓋，

逆時針方向旋轉打開



正確服用方法

請將瓶口靠在量杯邊緣，倒入 1 次劑量(6 mL)。請務必遵守指示，服用 1 次劑量。

※請將瓶子放置於平坦處。



成分及分量

Medicon 止咳液 Pro 為淡黃褐色透明黏稠液體，18mL(成人 1 天劑量)中，含有下列成分。


成分	含量(18 mL 中)	作用
氫溴酸右美沙芬水合物	45 mg	鎮靜咳嗽
煤溜油酚磺酸鉀	270 mg	改善排痰

添加物：乙醇、白糖、焦糖、苯甲酸、氫氧化鈉、苯甲酸苄酯、乙基香蘭素、甘油、香蘭素、香料



保管及使用上的注意事項

- 請將瓶蓋蓋緊，保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質)
- 量杯使用後，請水洗並乾淨保存。
- 關閉瓶蓋時，請仔細擦拭瓶口後再旋緊。藥液附著於瓶口，直接旋緊瓶蓋，可能偶爾難以打開。此外，瓶蓋未旋緊，瓶內的藥液可能漏出或受到污染。
- 瓶蓋難以打開的情況下，將瓶蓋部分浸泡於熱水(50~60°C)，就會變得比較容易打開。
- 請勿服用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。

● Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
服務時間：9 點~17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」

● (獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商

Shionogi Healthcare 株式會社

大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號