支援多國語言，為您語音朗讀。敬請掃描。
產品資訊
Product features
QR Translator

此文件為日文仿單之譯文，提供給在日本購買本產品使用的消費者，協助理解商品。服用本產品前，請務必詳閱此文件，理解內容。

祛痰藥

日本藥局方 L-羧甲司坦錠
Mucodyne 祛痰錠 *Pro*500

銷售名稱:Mucodyne 祛痰錠 Pro500

第 2 類醫藥品

SHIONOGI

Mucodyne 祛痰錠 Pro500 是一款祛痰藥，透過 L-羧甲司坦的作用，改善排痰。

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

1. **下列的人請勿服用**
   曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
2. **服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品**
   其他鎮咳祛痰藥、感冒藥

諮詢事項

1. **下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者**
   (1) 正在接受醫師治療的人
   (2) 孕婦或可能懷孕的人
   (3) 正在哺乳的人
   (4) 年長者
   (5) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
   (6) 有下列症狀的人　發高燒
   (7) 被診斷出下列疾病的人　心臟病、肝臟病
2. **服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者**

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、腹瀉、腹痛、腹部膨脹感、口乾
呼吸器官	呼吸困難
其他	發燒、浮腫

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、 中毒性表皮壞死鬆解症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。

3. **即使服用 5～6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者**
   此外，即使症狀改善，服用超過 2 週的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效及效果

痰

用法及用量

請搭配水或溫水服用下列劑量。此外，服用間隔請間隔 4 小時以上。

年齡	1 次劑量	1 天服用次數
成人(15 歲以上)	1 錠	3 次
未滿 15 歲	不得服用	

● 請嚴格遵守規定的用法及用量。

● 取出錠劑的方法
如右圖所示，請以指尖用力按壓裝入錠劑的 PTP 片材的凸部，壓破背面的鋁箔，取出服用。
(不小心直接誤食，可能導致鋁箔刺破食道黏膜等意外事故。)

成分及分量

Mucodyne 祛痰錠 Pro500 為白色薄膜衣錠，3 錠(成人 1 天劑量)中，含有下列成分。

成分	含量(3 錠中)	作用
L-羧甲司坦	1500 mg	改善排痰

添加物：交聯羧甲基纖維素鈉、聚乙烯醇(部分皂化物)、蔗糖脂肪酸酯、硬脂酸鎂、甲基纖維素、羥丙基纖維素、滑石。

保管及使用上的注意事項

(1) 請保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。
(2) 請保管於兒童拿不到的地方。
(3) 請勿從 PTP 片材取出，換裝於其他容器。
(可能導致誤用或變質)
(4) 請勿服用超過使用期限的產品。



詢問處

關於本產品的詢問，請聯絡您購買的商店或下列單位。
● Shionogi Healthcare 株式會社「醫藥資訊中心」
電話:大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
服務時間:9 點～17 點(週六、週日、國定假日除外)

關於「副作用受害救濟制度」
● (獨立行政法人)醫藥品醫療機器綜合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話:0120-149-931 (免費專線)

製造銷售商
Shionogi Healthcare 株式會社
大阪市中央區北濱 2 丁目 6 番 18 號